

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-7-8-68823709

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE,  
LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture  
Chemin d'Artigues, 33 - CENON

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46

25 F.

Supplément N° 1 au Bulletin Technique N° 95 d'Août 1968

I968-24

## AVERTISSEMENTS

## VIGNE

Mildiou - Les fortes pluies d'orages de ces derniers jours, parfois accompagnées de grêle, ont délavé les produits de traitements appliqués la semaine dernière. En outre, des taches souvent nombreuses, en particulier dans les Charentes, ont été observées.

Pour éviter l'extension des foyers et cicatriser les blessures de grêle, il conviendrait donc de renouveler le traitement dès réception de cette note en passant de chaque côté du rang.

Nous rappelons qu'un poudrage cuprique ou organo-cuprique complètera l'action de la pulvérisation lorsque le Rot brun sera à redouter.

Black-Rot - Les premières attaques sur les grains viennent d'être découvertes. D'autres risquent d'apparaître dans les jours à venir.

Le traitement conseillé ci-dessus sera également valable contre le Black-Rot.

Cicadelles (*Empoasca flavescens*): Les pullulations larvaires deviennent importantes dans certaines parcelles n'ayant pas reçu antérieurement de traitements insecticides contre les Vers de la grappe (Esters phosphoriques, Organo-chlorés) et contre l'Araignée jaune (Esters phosphoriques).

En conséquence, et après avoir contrôlé la présence des Cicadelles avant toute intervention, prévoir une application insecticide dans les parcelles infestées dès réception du présent avis.

Araignée jaune (*Eotetranychus carpini*) - Les dégâts généralisés commencent à se manifester localement sur Sémillon (Roussissement de la végétation). Intervenir rapidement dans les vignobles attaqués n'ayant pas été traités au cours du mois de juillet.

.../...

P 281

.../...

## ARBRES FRUITIERS

Carpocapse des Pommes et des Poires - Les conditions sont favorables aux pontes du deuxième vol. En outre, les récentes pluies ont délavé les traitements précédents. Renouveler la protection des vergers dès réception du présent avis.

Carpocapse des Prunes - Dans les plantations mal protégées, la proportion de fruits véreux atteint 20% à la suite des pontes importantes signalées dans notre bulletin N° 20 du 9 juillet.

Prévoir un dernier traitement dès à présent en respectant les délais légaux d'utilisation des insecticides avant la récolte.

### INFORMATIONS

Rouille du Prunier - Des attaques de Rouille sont signalées dans plusieurs vergers. Pour éviter l'extension de la maladie on pourra ajouter un fongicide à la bouillie préconisée contre le Carpocapse des Prunes.

Araignée rouge (*Panonychus ulmi*) - Surveiller attentivement les vergers. Des dégâts sur la végétation apparaissent depuis les derniers jours de juillet dans diverses plantations de Pruniers, Pêchers, Pommiers et Poiriers.

Appliquer un acaricide d'été lorsque les pullulations d'Acariens sont importantes.

Bordeaux, le 5 Août 1968

Le Contrôleur  
chargé des Avertissements  
C. ROUSSEL

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux  
J. BRUNETEAU